Bollettino settimanale del

CENTRO OPERATIVO PER LA LOTTA ALLE ZANZARE

BIELLESE ED ALTO VERCELLESE
R.T.S. dott. Bruciaferri Davide tel. 348/3018155 e-mail: zanzare.biellese@gmail.com

Periodo di riferimento: 02 - 08 agosto 2021

Livelli medi d'infestazione dei focolai di sviluppo larvale

	Nullo/molto basso (0-5 larve/½ l)	**Basso** (da 5 a 10 larve/½ l)	**Medio** (da 10 a 20 larve/½ l)	**Elevato** (da 20 a 50 larve/½ l)	**Molto elevato** (>50 larve/½ l)
Caditoie				✓	
Focolai naturali				✓	

Trattamenti nei Comuni dal 02/08 al 08/08/2021

Comune	**Adulticidi** (Prodotto utilizzato: piretroidi)	**Larvicidi Biologici** Codici focolai trattati (Prodotto utilizzato *Bacillus Thuringiensis var. israelensis*)
Albano V.se		4A005AL, 4A021AL
Arborio		4A025AR, 4A026AR
Borgosesia		3B026BG, 3B027BG
Cavaglià	✓ (4/8)	
Cossato	✓ (6/8)	
Gaglianico	✓ (5/8)	
Gattinara		3B024GT, 3B035GT, 3B036GT
Ghislarengo		4A005GH
Greggio		4A005GE
Lessona		3A002LS, 3A006LS, 3A009LS
Lozzolo		3B011LO
Sostegno		3B003SS, 3B004SS

Trattamento tombini pubblici *(prodotto utilizzato: Diflubenzuron/B.t.i.+ B.s.)*

Comuni oggetto di trattamento:
Arborio, Azeglio, Curino, Mosso, San Giacomo V.se, Soprana, Strona, Trivero, Vallemosso, Valle S. Nicolao.

Previsioni e consigli per limitare il livello di molestia

Le numerose piogge che hanno fin d'ora caratterizzato l'estate 2021 hanno sicuramente favorito le specie di zanzara degli ambienti di tipo "alluvionale" fra cui quella che solitamente è indicata come "zanzara di risaia". La loro presenza si è evidenziata sia mediante i nostri monitoraggi che attraverso le diverse testimonianze della popolazione residente che riferisce abbondanti "invasioni" serali, durante il calar del sole, tipiche di queste zanzare. Il miglioramento delle condizioni meteorologiche previsto per il prossimo periodo se da un lato dovrebbe "disinnescare" molti dei focolai naturali di tali specie, dall'altro potrebbe amplificare la percezione della molestia sia per la ormai presenza abbondante di adulti che per la maggior propensione della popolazione alla frequentazione di spazi aperti durante le ore serali. A differenza degli anni precedenti si prevede un leggero allungamento del periodo critico. Questa settimana sarà completato il secondo ciclo di trattamento alle tombinature pubbliche di tutti i Comuni aderenti e subito dopo inizierà il terzo. La scorsa settimana sono stati effettuati test per il controllo dell'efficacia di tali trattamenti che hanno dimostrato il buon funzionamento del prodotto utilizzato e la sua corretta distribuzione, facendo rilevare pochissime infestazioni. I nostri controlli presso le aree ortive sono stati incrementati perché entriamo nel periodo di maggior diffusione della zanzara tigre e purtroppo sono ancora molte le segnalazioni da parte dei Tecnici del Centro Operativo, di situazioni non idonee con particolare riferimento alla presenza di bidoni per l'irrigazione non opportunamente protetti e ricchi di infestazioni larvali.